

Prevención y control de enfermedades en Pepino biorracional



ENFERMEDADES Y PLAGAS DE SUELO		(PRODUCTOS Y DOSIS/ha)											
FUNGOSAS DE LA RAIZ	APLICAR	BIOBACTER O	FULLKOVER HF	FULLKOVER O	VIRABLOCK	VIRABLOCK 3G50	BEST ULTRA F	BEST ULTRA S	NEMAXXION BIOL	MILD OUT PLUS	TRICHOBIOI	BIOFUMIGATE OR N	FITOPLAZMIX
FUSARIUM	Al suelo							2 L			2 L	18 L	
VERTICILLIUM	Al suelo							2 L			2 L	18 L	
RHIZOCTONIA	Al suelo							2 L			2 L	18 L	
PHYTIUM	Al suelo							2 L			2 L	18 L	
PHYTOPHTHORA	Al suelo							2 L			2 L	18 L	
BACTERIANAS DE SUELO													
ERWINIAS	Al suelo	1 L											
PSEUDOMONAS	Al suelo	1 L											
NEMATODOS FITOPATOGENOS													
AGALLADORES	Al suelo								4 L			18 L	
LESIONADORES	Al suelo								4 L			18 L	

BIOFUMIGATE OR N: EN CULTIVO ESTABLECIDO LA DOSIS TOTAL (18 L) SE DIVIDE EN TRES APLICACIONES DE 6 L CADA UNA A INTERVALOS DE 7 DÍAS; ANTES DE TRASPLANTE APLICAR LA DOSIS TOTAL (18 L) Y TRASPLANTAR A LOS 7 DÍAS; **NOTA ES NECESARIA LA INOCULACIÓN CON MICROORGANISMOS BENEFICOS ESPECIFICOS PARA EL PROBLEMA A CORREGIR (HONGOS, BACTERIAS, NEMATODOS E INSECTOS)** SE SUGIERE LA ADICION DE **K BORON CA (1 L/HA)** PARA TODAS LAS ENFERMADEDES AEREAS YA SEA CAUSADAS POR HONGOS, BACTERIAS, VIRUS Y FITOPLASMAS

EL TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE VIRUS ES DE TRES APLICACIONES FOLIARES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIONES Y LA APLICACIÓN AL SUELO ES DE DOS APLICACIONES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIÓN

BIOBACTER O: EL TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE BACTERIAS FOLIARES ES DE TRES APLICACIONES FOLIARES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIONES Y PARA EL CONTROL DE CLAVIBACTER ADEMAS DE LAS FOLIARES ES NECESARIO APLICAR AL SUELO DOS APLICACIONES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CLAVIBACTER

LAS APLICACIONES AL SUELO DE **TRICHOBIOI** Y **BEST ULTRA S**, MEZCLAR CON **FULVIMAX ALGA+** EN RELACIÓN 1:1
 TODAS LAS APLICACIONES FOLIARES SE RECOMIENDA LA ADICIÓN DE **KACTUZ AD** A UNA DOSIS DE 500 cc/ha
 AJUSTAR EL pH DE LA SOLUCIÓN A APLICAR CON **AZDOL O** EN UN RANGO DE 6.5 A 7.0

KACTUZ AD Y AZDOL O: SON PRODUCTOS DE LA EMPRESA FITOKIMICA INDUSTRIAL DE MÉXICO SA DE CV



Prevención y control de enfermedades en Pepino biorracional



ENFERMEADES Y PLAGAS DE SUELO		(PRODUCTOS Y DOSIS/Ha)											
FUNGOSAS DE TALLO, HOJAS Y FLORES	APLICAR	BIOBACTER O	FULLKOVER HF	FULLKOVER O	VIRABLOCK	VIRABLOCK 3G50	BEST ULTRA F	BEST ULTRA S	NEMAXXION BIOL	MILD OUT PLUS	TRICHOBIOL	BIOFUMIGATE OR N	FITOPLAZMIX
CERCOSPORA	Foliar		1 L	1 L			1 L						
MYCOSPHAERELLA	Foliar		1 L	1 L			1 L						
ALTERNARIA	Foliar		1 L	1 L			1 L						
CENICILLAS	Foliar		1 L	1 L			1 L			1 L			
MILDIUS	Foliar		1 L	1 L			1 L			1 L			
BOTRITYS	Foliar		1 L	1 L			1 L						
SEPTORIA	Foliar		1 L	1 L			1 L						
ANTRACNOSIS	Foliar		1 L	1 L			1 L						
BACTERIAS Y FITOPLASMAS													
XHANTOMONAS	Foliar	1 L											
PSEUDOMONAS	Foliar	1 L											
ERWINIAS	Foliar	1 L											
FITOPLASMAS	Foliar	1 L											1 L
VIRUS													
VIROSI	Foliar				0.75 L	0.75 L							
VIROSI	Al suelo				1 L	1 L							

BIOFUMIGATE OR N: EN CULTIVO ESTABLECIDO LA DOSIS TOTAL (18 L) SE DIVIDE EN TRES APLICACIONES DE 6 L CADA UNA A INTERVALOS DE 7 DÍAS; ANTES DE TRASPLANTE APLICAR LA DOSIS TOTAL (18 L) Y TRASPLANTAR A LOS 7 DÍAS; **NOTA ES NECESARIA LA INOCULACIÓN CON MICROORGANISMOS BENEFICOS ESPECIFICOS PARA EL PROBLEMA A CORREGIR (HONGOS, BACTERIAS, NEMATODOS E INSECTOS)**
SE SUGIERE LA ADICION DE K BORON CA (1 L/HA) PARA TODAS LAS ENFERMEADES AEREAS YA SEA CAUSADAS POR HONGOS, BACTERIAS, VIRUS Y FITOPLASMAS

EL TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE VIRUS ES DE TRES APLICACIONES FOLIARES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIONES Y LA APLICACIÓN AL SUELO ES DE DOS APLICACIONES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIÓN

BIOBACTER O: EL TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE BACTERIAS FOLIARES ES DE TRES APLICACIONES FOLIARES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIONES Y PARA EL CONTROL DE CLAVIBACTER ADEMAS DE LAS FOLIARES ES NECESARIO APLICAR AL SUELO DOS APLICACIONES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CLAVIBACTER

LAS APLICACIONES AL SUELO DE **TRICHOBIOL** Y **BEST ULTRA S**, MEZCLAR CON **FULVIMAX ALGA+** EN RELACIÓN 1:1
 TODAS LAS APLICACIONES FOLIARES SE RECOMIENDA LA ADICIÓN DE **KACTUZ AD** A UNA DOSIS DE 500 cc/ha
 AJUSTAR EL pH DE LA SOLUCIÓN A APLICAR CON **AZIDOL O** EN UN RANGO DE 6.5 A 7.0

KACTUZ AD Y AZIDOL O: SON PRODUCTOS DE LA EMPRESA FITOKIMICA INDUSTRIAL DE MÉXICO SA DE CV

