

# Prevención y control de enfermedades en Tomate biorracional



ENFERMEDADES Y PLAGAS DE SUELO		( PRODUCTOS Y DOSIS/ha)											
FUNGOSAS DE LA RAIZ	APLICAR	BIOBACTER O	FULLKOVER HF	FULLKOVER O	VIRABLOCK	VIRABLOCK 3G50	BEST ULTRA F	BEST ULTRA S	NEMAXXION BIOL	MILD OUT PLUS	TRICHOBIOL	BIOFUMIGATE OR N	FITOPLAZMIX
FUSARIUM	Al suelo							2 L			2 L	18 L	
RHIZOCTONIA	Al suelo							2 L			2 L	18 L	
PHYTIUM	Al suelo							2 L			2 L	18 L	
PHYTOPHTHORA	Al suelo							2 L			2 L	18 L	
<b>BACTERIANAS DE SUELO</b>													
PECTOBACTERIUM	Al suelo	1 L										18 L	
PSEUDOMONAS	Al suelo	1 L										18 L	
CLAVIBACTER	Al suelo	1 L										18 L	
<b>NEMATODOS FITOPATOGENOS</b>													
AGALLADORES	Al suelo								4 L			18 L	
LESIONADORES	Al suelo								4 L			18 L	
ENFERMEDADES FOLIARES		( PRODUCTOS Y DOSIS/ha)											
<b>FUNGOSAS DE TALLO, HOJAS Y FLORES</b>													
ALTERNARIA	Foliar		1 L	1 L				1 L					
BOTRYTIS	Foliar		1 L	1 L				1 L		1 L			
COLLETOTRICHUM	Foliar		1 L	1 L				1 L		1 L			
LEVILLULA TAURICA	Foliar		1 L	1 L				1 L					
PHYTOPHTHORA	Foliar		1 L	1 L				1 L					
SCLEROTINIA	Foliar		1 L	1 L									
VERTICILLIUM	Foliar		1 L	1 L									
<b>BACTERIAS Y FITOPLASMAS</b>													
XANTHOMONAS	Foliar	1 L											
PSEUDOMONAS	Foliar	1 L											
CLAVIBACTER MICHIGANENSE	Foliar	1 L											
FITOPLASMAS	Foliar												0.5 L
<b>VIRUS</b>													
VIROSIS	Foliar				0.75 L	0.75 L							
VIROSIS	Al suelo				1 L	1 L							

**BIOFUMIGATE OR N:** EN CULTIVO ESTABLECIDO LA DOSIS TOTAL (18 L) SE DIVIDE EN TRES APLICACIONES DE 6 L CADA UNA A INTERVALOS DE 7 DÍAS; ANTES DE TRASPLANTE APLICAR LA DOSIS TOTAL (18 L) Y TRASPLANTAR A LOS 7 DÍAS; **NOTA ES NECESARIA LA INOCULACIÓN CON MICROORGANISMOS BENEFICOS ESPECIFICOS PARA EL PROBLEMA A CORREGIR (HONGOS, BACTERIAS, NEMATODOS E INSECTOS)**  
SE SUGIERE LA ADICION DE **K BORON CA (1 L/HA)** PARA TODAS LAS ENFERMEADES AEREAS YA SEA CAUSADAS POR HONGOS, BACTERIAS, VIRUS Y FITOPLASMAS

EL TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE VIRUS ES DE TRES APLICACIONES FOLIARES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIONES Y LA APLICACIÓN AL SUELO ES DE DOS APLICACIONES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIÓN

**BIOBACTER O:** EL TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE BACTERIAS FOLIARES ES DE TRES APLICACIONES FOLIARES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIONES Y PARA EL CONTROL DE CLAVIBACTER ADEMAS DE LAS FOLIARES ES NECESARIO APLICAR AL SUELO DOS APLICACIONES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CLAVIBACTER

LAS APLICACIONES AL SUELO DE **TRICHOBIOL** Y **BEST ULTRA S**, MEZCLAR CON **FULVIMAX ALGA+** EN RELACIÓN 1:1  
TODAS LAS APLICACIONES FOLIARES SE RECOMIENDA LA ADICIÓN DE **KACTUZ AD** A UNA DOSIS DE 500 cc/ha  
AJUSTAR EL pH DE LA SOLUCIÓN A APLICAR CON **AZIDOL O** EN UN RANGO DE 6.5 A 7.0

**KACTUZ AD** Y **AZIDOL O:** SON PRODUCTOS DE LA EMPRESA FITOKIMICA INDUSTRIAL DE MÉXICO SA DE CV

